

## CONSEILS APRES UNE COELIOSCOPIE

### Soins de paroi

Les cicatrices doivent être laissées le plus souvent possible au contact de l'air et maintenues bien sèches.

Un nettoyage ordinaire (type savon de Marseille) suffit.

Une infirmière pratiquera l'ablation des fils selon le délai de prescription figurant sur l'ordonnance.

### Traitements de sortie

Phlébites et embolies pulmonaires sont les complications majeures de toute chirurgie gynécologique.

La prescription d'anticoagulants doit être suivie scrupuleusement.

Une vérification de taux de plaquettes sanguines est nécessaire pendant cette période; elle doit être effectuée 2 fois par semaine dans un laboratoire de ville.

Les anticoagulants sont susceptibles de provoquer une chute du taux de plaquettes par un mécanisme immuno-allergique. Cette complication rare fait courir un risque hémorragique.

Toute chute des taux de plaquettes (<150 000 /l) doit être signalée au médecin anesthésiste ou au chirurgien :

Tel secrétariat chirurgie gynécologique : 01 56 61 62 04

Tel bureau médecins anesthésistes : 01 56 61 64 26

\*Les antalgiques peuvent être pris de façon variable, à la demande.

### Hygiène de vie

Aucune précaution particulière n'est suggérée : une activité physique ou sportive sera possible dès la disparition des douleurs post opératoires, environ 3 semaines après l'intervention.

### Dernières recommandations :

\*N'oubliez votre rendez-vous de consultation post opératoire. Cette consultation doit avoir lieu un mois environ après l'intervention. Votre compte rendu opératoire et histologique vous sera alors communiqué.

En cas de problème post opératoire, nous vous remercions de prévenir le secrétariat, votre chirurgien en sera avisé. (tel 01 56 61 62 04)

Un service d'urgence est à votre disposition jour et nuit au deuxième étage dans le secteur maternité.